



UNICEPLAC
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC
Curso de Medicina
Trabalho de Conclusão de Curso

**Análise da incidência de suicídios e lesões autoprovocadas no Brasil
nos anos de 2009 a 2019**

Gama-DF
2021

**MARCELLE RODRIGUES CARNEIRO DE SOUZA REIS
PEDRO HENRIQUE ALVES MIRANDA**

**Análise da incidência de suicídios e lesões autoprovocadas no Brasil
nos anos de 2009 a 2019**

Artigo apresentado como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Medicina pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.

Orientador: Prof. Me. Marco Antônio Alves Cunha

Gama-DF
2021

**MARCELLE RODRIGUES CARNEIRO DE SOUZA REIS
PEDRO HENRIQUE ALVES MIRANDA**

Análise da incidência de suicídios e lesões autoprovocadas no Brasil nos anos de 2009 a 2019

Artigo apresentado como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Medicina pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.

Gama-DF, 06 de novembro de 2021.

Banca Examinadora

Prof. Me. Marco Antônio Alves Cunha
Orientador

Prof. Me. Alessandro R. Caruso da Cunha
Examinador

Prof. Me. Flávio Dutra de Moura
Examinador

Análise da incidência de suicídios e lesões autoprovocadas no Brasil nos anos de 2009 a 2019

Marcelle Rodrigues Carneiro de Souza Reis¹
Pedro Henrique Alves Miranda²

Resumo:

Caracteriza-se a partir dos dados do DATASUS a incidência de suicídios e lesões autoprovocadas na população brasileira, seu número de internações e óbitos em um espaço de tempo considerável. A autolesão é uma ação resultante da pessoa que almeja na automutilação o alívio de sua condição psíquica, mental ou cognitiva, podendo ser englobada no comportamento suicida, o qual as pessoas tentam ou obtêm êxito no autoextermínio. Foi realizado um estudo de série temporal com avaliação estatística por teste da normalidade de Kolmogorov-Smirnov e Qui Quadrado de Pearson para mensurar a incidência de internações e óbitos por lesão autoprovocada durante os anos de 2009 a 2019. Apesar dos problemas de subnotificação, os resultados encontrados nessa análise corresponderam a um aumento das taxas de suicídio entre homens, brancos, residentes das regiões Sul e Sudeste e faixa etária entre 30 a 39 anos, já para as internações, o predomínio foi entre mulheres, de 20 a 29 anos, brancas e residentes da região Sul e Sudeste, e Piauí. Assim, certos pontos merecem destaque por serem fatores de risco com alta incidência, inclusive sustentados pela literatura. Ser homem jovem, ser mulher, ter condição psiquiátrica, ser LGBT, ser caucasiano e da região Sul do Brasil, estão entre as principais propulsoras do comportamento autolesivo e de autoextermínio.

Palavras-chave: comportamento autodestrutivo; suicídio; tentativa de suicídio.

Abstract:

Based on DATASUS data, the incidence of suicides and self-harm in the Brazilian population, as well as hospitalizations and deaths are characterized during a period of years. Self-injury is an action resulting from the person who seeks in self-mutilation to alleviate their psychic, mental or cognitive condition, and it can be encompassed in suicidal behavior, which people try or succeed in self-extermination. A time series study was carried out with statistical evaluation using the Kolmogorov-Smirnov normality test and Pearson's Chi-Square test to measure the incidence of hospitalizations and deaths due to self-harm during the years 2009 to 2019. Despite the problems of underreporting, the results found in this analysis corresponded to an increase in suicide rates among white men, residents of the South and Southeast regions and aged between 30 and 39 years, while for hospitalizations, the predominance was among women, aged 20 to 29 years, white and residents of Piauí, the South and Southeast region. Thus, certain points are noteworthy for being risk factors with a high incidence, including those supported by the literature. Being a young man, being a woman, having a psychiatric condition, being LGBT, being Caucasian and from the South region of Brazil are among the main drivers of self-harm and self-destruction.

Keywords: self-injurious behavior; suicide; suicide, attempted.

¹Graduanda do Curso Medicina, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: marcellerodrigues.reis@gmail.com.

² Graduando do Curso Medicina, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: pedro.miranda@medicina.uniceplac.edu.br